

Celest[®] 100 FS سليست ١٠٠ مركز قابل للانسياب

توصيات الاستعمال:

أن عدم إتباع التوصيات في الجدول التالي ربما يؤدي ألي إصابة المحصول أو ضعف مكافحة المرض.

المحصول	المرض	الجرعة مل/طن بنور	ملاحظات
البطاطس	الريزوكونيا	٢٠٠	للمعاملة قبل الزراعة
	الفيوزاريوم، الهلمنتوسبوريم و الفوما	٥٠	للمعاملة قبل التخزين

مبيد فطري لمعاملة البذور

مركز قابل للانسياب

مبيد فطري تلامسي ذو مجال فعالية واسع الطيف وتأثير باقي طويل محدود النفاذ الى داخل البذور و قليل الانتقال داخل البادرات.

مكونات المادة الفعالة:

١٠٠ جرام / لتر فلورديوكسونيل *

*4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile

تصنيف منظومة الصحة العالمية:

المجموعة الثالثة III (نادراً ما يحدث تسمم إذا استخدم حسب التوصيات).

الإسعافات ألا وليه:

في حالة حدوث أي توعك، استدع الطبيب واعمل الإسعافات الأولية.

مضاد التسمم:

لا يوجد مضاد معين للتسمم. عالج بموجب الأعراض.

مجال الفعالية:

سليست ١٠٠ مركز قابل للانسياب يكافح الأمراض المهمة اقتصادياً مثل الريزوكونيا والفيوزاريوم والهلمنتوسبوريم والفوما و الأمراض المحمولة على البذور وفي التربة وكذلك الفطريات التي تصيب البذور في المخزن.

الإدارة المتكاملة للمرض:

● سليست ١٠٠ مركز قابل للانسياب يستخدم كجزء مكمل للسيطرة على أمراض البطاطس وهذا يتظلمن الجودة العالية للبذور والمعاملات الزراعية مثل الدورة الزراعية والوقت المثالي لحصاد الدرناات وتجنب جرحها والخزن الجيد لتقليل مصادر الإصابة ومعاملة الدرناات وهي نظيفة بالجرعة المناسبة من المبيد. ● يستخدم سليست مره واحدة في الموسم

تطبيقات الرش الفنية

الات الرش:

● يمكن رش سليست باي الة معاملة للبذور من خلال شبابير أو صحن دواره باستخدام ضغط ليعطي توزيع متجانس على الدرنة. ● يجب معايرة الة الرش لتعطي الجرعة الموصى بها. ● لمعاملة بذور البطاطس تركيب الة رش المبيد فوق الحزام الحامل للدرنة أو فوق محراث البذارة. ● **معاملة بذور البطاطس:** ● للحصول على تغطية جيدة بآلات الرش العادية

كيفية التخلص من نفايات المبيد وعبواته:

● يجب سكب المبيد المتبقي وكذلك الماء الذي غسلت به آلات الرش في حفرة بعيدة عن المساكن ومصادر المياه. ● التخلص من العبوات الفارغة بدفنها أو حرقها في مكان أمين بعيداً عن المساكن ومصادر المياه. ● لا يجوز استخدام العبوات الفارغة لأي غرض آخر.

يخفف مبيد سليست بالماء حتى ٢٠٠٠ مل لكل طن

بذور وحرك المزيج جيداً ثم استخدمه بنفس اليوم.

■ يمكن رش سليست بغير تخفيف ٥٠ مل /طن بنور باستخدام الة الحجم فائق الانخفاض.

■ يجب ان تكون درناات البطاطس خالية من الاتربة ويتوزع عليها المبيد بتجانس .

قابلية الخلط (المزج):

سليست يمكن مزجه مع المستحضرات القابلة للانسياب FS والقابلة لليل WS من مركبات معاملة البذور ذات التفاعل المتعادل.

سليست ١٠٠ FS غير قابل للمزج مع المركبات الحاوية على منيبات.

قواعد السلامة لتجنب أخطار المبيد:

■ البذور المعاملة قبل التخزين يجب ان لا تستخدم للأكل.

■ تجنب ملامسة المبيد للعينين والجلد

■ لا تستشق رذاذ الرش أو غبار المبيد ! اغسل اليدين والوجه قبل الطعام والشراب والتدخين

■ بدل ملابسك بعد العمل واغسل أجزاء الجسم التي تعرضت للمبيد .

■ اغسل ثياب العمل قبل ارتدائها ثانية .

■ عند الشعور بتوعك أو تسمم توقف عن العمل واستدع الطبيب واخلع الملابس الملوثة واغسل أجزاء الجسم الملوثة بالمبيد واسحب الشخص إلى الهواء الطلق وإذا ابتلع المبيد يعطى الشخص الفحم الطبي مع كثير من الماء.

البيئة والحياة البرية:

سام للكائنات المائية. تجنب تلويث مياه الري والاستعمال المنزلي أو مناطق تجمع المياه الجارية أو الراكة وشبكات الصرف برمي نفايات المبيد فيها. ابعد الأطفال و الماشية عن المناطق المرشوشة حتى نهاية فترة الانتظار. تجنب تلويث الطعام والعلف.

التخلص من المبيد المتناثر أو المتسرب:

● اشبع المادة المتناثرة بالرمل أو النشارة أو التربة واجمعها داخل كيس وادفنها في مكان أمين بعيداً عن مصادر المياه. ● اجمع التربة الملوثة وادفنها في مكان بعيد عن مصادر المياه. ● لا يجوز استخدام المادة المتناثرة والمتسربة ثانية.

شروط التخزين:

اخزن بعيداً عن الشمس والرطوبة في العبوات الأصلية المغلقة وفي مكان جيد التهوية وتجنب التخزين في درجات حرارة تزيد عن ٣٥ درجة مئوية.

فترة التخزين: سنتين .

مسئولية مستخدم المبيد:

يتحمل مستعمل المادة الأضرار الناتجة عن العوامل التي لا يسيطر عليها من قبل الشركة المنتجة مثل الطقس والتربة ونوع النبات وتقنية الرش كما يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن سوء التخزين أو الاستعمال.

® علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا.

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا وقاية

المزروعات ١, ٢

انتاج: سينجنتا لوقاية المزروعات بازل-سويسرا