

568037 YE/12E

NEORON[®] 500 EC

نيورون ٥٠٠ مستحلب[®]

الاسم الشائع والمحتوى من المادة الفعالة:

يحتوى الليتر الواحد على ٥٠٠ غ من البروموبروبيلات

Bromopropylate=isopropyl
4,4-dibromo-benzilate

**مبيد عناكب
واسع التأثير**

**مركز قابل
للإستحلاب**

الوكيل في اليمن:
شركة العاقل التجارية
شارع الزبيري - ص.ب. ٦٦
صنعاء - الجمهورية اليمنية ت: ٢٠٧٤٧٠ / ٢٠٧٥٩٣


رقم التصنيع: انظر الى الرقم
تاريخ الصنع: المطبوع
تاريخ الانتهاء: على العبوة



سريع للاشتعال

اليتر

syngenta



NEORON® 500 EC

نيoron® ٥٠٠ مستحلب

توصيات الاستعمال

فتره ما قبل الحصاد	معدل الاستخدام	الافقة	المحصول
٢١ يوم	٧٥-٥٠ مل /١٠٠ لتر ماء ١٠٠-٧٥ مل /١٠٠ لتر ماء	- حلم البراعم والصداء الاريفوي - العنابك الحمراء وغيره من العنابك	الحمضيات والأشجار متتساقطة الأوراق
١٤ يوم	١٠٥-١ لتر / هكتار	العنابك الحمراء	المحاصل الحقلية والخضروات
	١٠٠-٧٥ مل /١٠٠ لتر ماء	العنابك الحمراء	نباتات الزينة
٢١ يوم	١٠٠-٧٥ مل /١٠٠ لتر ماء	حلم الأوراق المتبدن والعنابك الحمراء	العنبر

يجب الرش قبل استعمال الأرضية و يجب التغطية الكاملة للنباتات و تجنب الرش في ساعات النهار الحارة و عندها يكون النبات مبلل او في حالة نزول المطر.

- يمكن استخدام نيoron ٥٠ للرش بالحجم المتأهي في الصغر (ULV) ٥٠-٢٥ لتر / هكتار في الرش بالطارات.

فتره التخزين

ابداً المكافحة عند بداية ظهور الأرضية و تكرر كلما دعت الحاجة و يؤخذ في الاعتبار الحد الاقتصادي للجرح للأفقة.

معلومات خاصة عن التعامل مع المبيد:

الإسعافات الأولية:

في حالة ظهور أي أعراض للتسسم يجب استدعاء الطبيب.

مضاد التسسم:

لا يوجد مضاد تسسم معين، يعالج حسب الاعراض.

الحياة البرية:

يمكن استخدام المبيد على الأحياء البرية و غير سام للنحل.

الدخول للمنطقة المرشوشة:

لا تدخل المنطقة المرشوشة بالمبيد الا بعد ان يجف سائل الرش.

الأثر المتبقى:

لا توجد أي آثار باقية من المبيد إذا ما استخدم طبقاً للتوصيات المذكورة.

مسؤولية مستخدم المبيد:

يتتحمل مستعمل المبيد الأضرار الناتجة عن العوامل التي لا يسيطر عليها من قبل المنتج. كما لا تتحمل الشركة الصانعة مسؤولية الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال.

علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا لوقاية المزروعات ٢٠٠١

الشركة المنتجة: سينجنتا لوقاية المزروعات - بازل/سويسرا

مركز قابل للاستحلاب
نيoron ٥٠٠ اي سي مبيد عنابكي متخصص و يستخدم على مدى واسع من أنواع المحاصيل.

مكونات المادة الفعالة:
٥٠٠ جرام / لتر بروموبروبيلات
(isopropyl 4,4-dibromobenzilate)

خصائص المركب:
نيoron ٥٠٠ اي سي مبيد حلم و عنابك متخصص غير جهازي له تأثير قوي باللامسة. و يؤثر على كل الأطوار المتعددة للعلم و العنابك و له تأثير واضح على البيض في الصيف، لا يتباين و يستخدم في مدى واسع من درجات الحرارة و في الجرعات العالية يؤثر على العلم و العنابك المقاومة للمبيدات الحلالية و العنكبوتية.

مجالات الاستعمال:
نيoron ٥٠٠ له تأثير على كل العنابك المهمة اقتصادياً مثل:
- حلم البراعم الاريفوي و العلم الصنفي و العنابك الحمراء و العلم المبطط و العلم الناعم
- و الحصول على أفضل مكافحة للعنابك الحمراء يكون الرش بعد الأنهار.

المكافحة المتكاملة:
استخدم المبيد بموجب التوصيات في بداية الموسم و ميادنته بمبيد آخر له طريقة تأثير مختلفة و يؤخذ في الاعتبار الحد الاقتصادي للجرح للأفقة. لا تبادر نيoron بمبيد الديكوفون، و على الأشجار متتساقطة الأوراق و الحمضيات و العنبر يعبر التبرون أمن على الأطوار الفير الكاملة للحشرات و العنابك النافعة و النحل.

قابلية المدرج:
نيoron ٥٠٠ قليل للمزج مع معظم المبيدات الحشرية و القطرية ما عدا المبيدات التي لها تأثير قوي مثل الكبريت و الكبريت الجيري و النحاس. و عند الشك يجب عمل اختبار قابلية المدرج.

تأثير على النباتات:
اذا استخدم نيoron ٥٠٠ بموجب التوصيات فليس له اي تأثير ضار على النبات و في حالة الشك يجب اولاً التأكد من مدى تحمل هذه النباتات للمبيد.

طرق الرش/المعدات و حجم الرش المحاصل الحقلية - الرش الأرضية:
يمكن استعمال ذراع الرش المحمول خلف الحراثة و المرشة الظهرية و مؤثر الرش الذي يعمل بتيار الهواء استخدم ٢٠٠ لتر / هكتار و عندما يكون المجموع الخصري كثيف استخدم ٥٠٠ لتر / هكتار. اشجار المحاكمة متتساقطة الأوراق و الحمضيات:
استخدم المرشة التي تعمل بتيار الهواء المقطرة او المحمولة و وجه تيار الهواء حسب شكل الشجرة استخدم من ٠٠٠-٤٠٠ لتر / هكتار. تأكيد من معايرة المرشة قبل الاستخدام بحيث تعطي تقطيع كاملة بالحجم المطلوب من محلول الرش. يجب تنظيف المرشة تماماً بعد الرش.

طريقة الخلط:
اضف الجرعة الموصى بها من المبيد الى الخزان المملوء الى نصفه من الماء مع التقليب الجيد ثم اكمل ملن الخزان. دائمآ حرك المزيج جيداً و استخدمه خلال ساعتين من تحضيره.

ملاحظات:
- ي jal النبات بالكامل و تجنب انفسال و انجراف المبيد بعيداً عن المحصول المستهدف و لا تزيد الجرعة عن الموصى بها و تجنب الرش إذا كان النبات مبللاً و في الأوقات الحارة و الماطرة.