

L119897 YEME/11

TECTO® 500 SC

تكتو® ٥٠٠ مركز معلق

مبيد فطري - مركز معلق

مضاد التسمم:

لا يوجد مضاد خاص للتسمم ، يعالج حسب الأعراض.

® علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينجنتا

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينجنتا لوقاية
المزروعات ٢٠٠٥

الشركة المنتجة: سينجنتا لوقاية المزروعات -
بازل / سويسرا

مبيد فطري جهازي لمكافحة طيف واسع من
الامراض يستخدم كوقائي وعالجي بعد الحصاد
او قبل الحصاد او قبل الزراعة على طيف واسع
من المحاصيل.

المادة الفعالة:
ثيابندازول ٥٠٠ غم / كغم

تصنيف منظمة الصحة العالمية :
المجموعة الثالثة (نادرًا ما يحدث تسمم حاد)

1 litre

١ لتر

قبل الاستعمال اقراء النشرة المرفقة جيداً.

في حالة الطوارئ رجاء الاتصال بمركز سينجنتا للإنذار - هيدرسفيلد - إنجلترا
هاتف: 00 44 1484 433 00 44 1484 538 00 197 فاكس:

تكتو ٥٠٠ مبيد فطري فعال لمكافحة امراض مابعد الحصاد مثل البوتربيتس والانثراكنوز والبنسيليوم والاسبرجلس السكلوروتينيا والبتربيودبلوديا والفيوزاريوم والعنف الاسود والفواما وامراض قبل الحصاد مثل العفن البني على اللوزيات والانثراكنوز والبياض الدقيقى والتبعق السركسبوري والسبتوري والاسكويكتا والدبلاوديا والذبول وقبل الزراعة لمعاملة البذور ضد التفحمات وعفن البادرات والريزوكتونيا والفيوزاريوم والعفن الابيض .

له خاصية الانتقال مع العصارة النباتية الى كافة اجزاء النبات بما فيه الجذور سواء استخدام رشا او سقياً وكذلك يتميز بسرعة امتصاصه وفعاليته .

يستخدم على جميع انواع ثمار الخضار الفاكهة والحرجيات ومحاصيل الحقل والاعلاف والمسطحات الخضراء.

طريقة الاستخدام : **الموز:**

غطس الثمار حسب معدل الاستخدام المذكور في الجدول تجنب استخدام النحاس او العوامل المؤكسدة مثل الكلورات والنيترات وال PH العالى قد يربى المادة الفعالة .

المانجو والباباى: غطس الثمار حسب معدل الاستخدام .

التفاحيات:

غطس الثمار حسب معدل الاستخدام ولا غطس الثمار في المبيد اكثرا من ٣ دقائق عامل التفاح قبل وبعد التخزين اما الكمثرى مرة واحدة فقط

معلومات عامة :

- نظف المعدات قبل الاستخدام واخلط المبيد حيدأ.
- استخدم التغطيس على شكل دورة مستمرة واستبدل محلول المعلق بعنابة لمعاملة الشمار.
- غير محلول التغطيس عندما يصير وسخ او ملوث.
- لا تستخدم محلول المبيد اكثر من ٢٤ ساعة او اكثـر.
- غير المعلق اذا نقص التركيز عن ٨٥% عن معدل الاستخدام.
- لا تخزن محلول المبيـد لاستخدامـة ثانية.
- جفـف الشـمار بعد المعـاملـة.

قواعد السلامة لتجنب أخطار المبيـد:

- احفظـه في مـكان مـغلـق وـبعـيد مـن مـتناول الـاطـفال
- تجـنب مـلامـسة المـبيـد لـلـعـينـيـن وـالـجـلد
- لا تستـنشـق رـذاـد الرـش أو غـبـار المـبيـد ، اغـسلـيـدـيـنـوـالـوـجـه قـبـلـ الطـعـامـوـالـشـرـابـوـالـتـدـخـين
- بدـلـ مـلـاـبـسـكـ بـعـدـ الـعـلـمـوـاـغـسـلـ أـجـزـاءـ الـجـسـمـتـيـ تـعـرـضـتـ لـلـمـبـيـدـ.
- اغـسلـ ثـيـابـكـ قـبـلـ اـرـتـدـائـهـ ثـانـيـةـ.
- عندـ الشـعـورـ بـتـوعـوكـ صـحـيـ تـوقـفـ عـنـ الـعـلـمـوـاـسـتـدـعـ الطـبـيـبـ.

الوصيّات بالاستخدام:

أن عدم إتباع التوصيّات في الجدول التالي ربما يؤدي إلى إصابة المحصول أو ضعف في مكافحة المرض

الملاحظات	وقت المكافحة	معدل الاستعمال	المرض	المحصول
تغطيس الثمار الرش قبل الحصاد	بعد الحصاد قبل الحصاد	٨٠-٤٠ مل/١٠٠ لتر ٧٢ مل/١٠٠ لتر	اعfan الثمار تبقع الثمار	الموز
تغطيس الثمار الرش قبل الحصاد	بعد الحصاد قبل الحصاد	٥٠٠-٢٠٠ جم/١٠٠ لتر ٣ جم/ لتر رش الأشجار	الاشراكنوز بتريلوديلديا	المانجو
تغطيس الثمار الرش قبل الحصاد	بعد الحصاد قبل الحصاد	٢٧٠-١٨٠ مل/١٠٠ لتر	العفن البني	العنبر
تغطيس الثمار الرش قبل الحصاد	بعد الحصاد قبل الحصاد	٤٠٠-٨٠٠ مل/١٠٠ لتر ٦٠-٨٠ مل/١٠٠ لتر	اعfan الثمار موت العنق	الحمضيات
تغطيس الثمار الرش قبل الحصاد	بعد الحصاد قبل الحصاد	٩٠٠-٢٢٠ مل/١٠٠ لتر ٩٠٠-٢٧٠٠ مل/١٠٠ لتر	اعfan الثمار بياض دقيق وجرب	التفاح
تغطيس الثمار	بعد الحصاد	٨٠-١٠٠ مل/١٠٠ لتر	اعfan الثمار	عنبر الفلفل
	قبل الحصاد	٥٤-٧٢ مل/١٠٠ لتر	العفن البني	اللوزيات

المحصول	المرض	معدل الاستعمال	وقت المكافحة	ملاحظات
الفراولة	البياض الدقيقى والعنف البنى	٢٤٠-١٢٠ مل/١٠٠ لتر ٧٢ مل/١٠٠ لتر	قبل الحصاد	
البصل والثوم	العنف الابيض	٣٦٠-١٨٠ مل/١٠٠ لتر	قبل الزراعة او رش التربة	
المسطحات	الريزوكتونيا	٥٠-٤٠ مل/١٠٠ م	رش ورقي	
نباتات الزينة	عنف البادرات	٢٠٠ مل/١٠٠ لتر	قبل الزراعة	
البطاطس	الريزوكتونيا	٣٠٠-٨٠ مل / طن بذور ٨٥ مل/طن ٢٠٠٠-١٠٠٠ مل/هكتار	قبل او بعد الزراعة رش التربة	

البيئة والحياة البرية:

سام للأسماك والحيوانات البحريّة.

- تجنب تلوث مياه الري والاستعمال المنزلي أو مناطق تجمع المياه الجاربة أو الراكدة وشبكات الصرف برمي نفايات المبيد فيها.
- ابعد الأطفال والماشية عن المناطق المرشوشة حتى نهاية فترة الانتظار.
- تجنب تلوث الطعام والعلف.

كيفية التخلص من نفايات المبيد وعبوته:

- يجب سكب المبيد المتبقّي وكذلك الماء الذي غسلت به آلات الرش في حفرة بعيدة عن المساكن ومصادر المياه.
- تخليص من العبوات الفارغة بدفعها أو حرقها في مكان أمن بعيداً عن المساكن ومصادر المياه.
- لا يجوز استخدام العبوات الفارغة لأي غرض آخر.

التخلص من المبيد المتناثر أو المتسرّب:

- اشبع المادة المتناثرة بالرمل أو النشار أو التربة واجمعها داخل كيس وادفعها في مكان أمن بعيداً عن مصادر المياه.
- اجمع التربة الملوثة وادفعها في مكان بعيد عن مصادر المياه.
- لا يجوز استخدام المادة المتناثرة والمتسربة ثانيةً.

شروط التخزين:

اخزن بعيداً عن الشمس والرطوبة في العبوات الأصلية المغلقة وفي مكان جيد التهوية وتتجنّب التخزين في درجات حرارة تزيد عن ٣٥ درجة مئوية.

فترة التخزين: ثلاثة سنوات.

L119897 YEME/11

TECTO® 500 SC

تكتو® ٥٠٠ مركز معلق

مبيد فطري - مركز معلق

مضاد التسمم:

لا يوجد مضاد خاص للتسمم ، يعالج حسب الأعراض.

® علامة تجارية مسجلة لمجموعة شركة سينچنتا

© حقوق الطبع محفوظة لشركة سينچنتا لوقاية
المزروعات ٢٠٠٥

الشركة المنتجة: سينچنتا لوقاية المزروعات -
بازل/سويسرا

مبيد فطري جهازي لمكافحة طيف واسع من
الامراض يستخدم كوقائي وعلاجي بعد الحصاد
او قبل الحصاد او قبل الزراعة على طيف واسع
من المحاصيل.

المادة الفعالة:

ثيابندازول ٥٠٠ غم / كغم

تصنيف منظمة الصحة العالمية :
المجموعة الثالثة (نادرًا ما يحدث تسمم حاد)

قبل الاستعمال اقراء النشرة المرفقة جيداً.

في حالة الطوارئ رجاء الاتصال بمركز سينچنتا للإنذار - هيدرسفيلد - انجلترا
هاتف: 00 44 1484 433 197 فاكس: 00 44 1484 538 444

1 litre
التر